





VII JORNADA DE PSICOPATÍA


Avances en Psicopatía. De la
investigación al tratamiento



28 DE FEBRERO DE 2025

Auditorio del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Lleida








VII JORNADA DE PSICOPATÍA

LIBRO DE ACTAS

Avances en Psicopatía. De la investigación al
tratamiento





Avances en Psicopatía. De la investigación al tratamiento

Libro de actas de la VII Jornada de Psicopatía.

Lleida, Catalunya, España.

Iolanda Batalla

Ángel Cuquerella

Anna Huguet

Beatriz Molinuevo

Roser Nadal

Vanessa Pera

Rafael Torrubia

David Quevedo-Barber

Sebastián Fernández-Ortiz



(Eds.)


1ª edición: Lleida, 2025.

ISBN: 978-84-9144-567-8

DOI: [10.21001/VII.jornada.de.psicopatia.2025](https://doi.org/10.21001/VII.jornada.de.psicopatia.2025)



Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informáticos, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros). Sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.








ÍNDICE

PRESENTACIÓN	1
PROGRAMA	2
LISTADO DE PÓSTERES.....	6
ORGANIZACIÓN.....	8
Comité Organizador.....	9
Comité Científico.....	9
Entidades organizadoras * y coorganizadoras	9
PONENTES	10
MESAS, SIMPOSIOS Y MASTERCLASS	14
MESAS REDONDAS	17
PÓSTERS	19







PRESENTACIÓN

El pasado 28 de febrero tuvo lugar, en el auditorio del *Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida (UdL)*, la **VII Jornada de Psicopatía**, organizada conjuntamente por *Gestió de Serveis Sanitaris* y *Sant Joan de Déu Terres de Lleida*, con la colaboración de la *Universitat de Lleida* y del *Institut de Recerca Biomèdica de Lleida*.

Desde su primera edición en 2013, esta Jornada ha experimentado un crecimiento constante, tanto en participación como en calidad científica, superando en esta última edición los 200 asistentes y los 18 pósteres. A día de hoy, sigue siendo la única jornada dedicada específicamente a la psicopatía que se celebra en el conjunto del estado español, lo que refuerza su singularidad e importancia dentro del panorama científico y profesional, y permite establecer sinergias entre los profesionales implicados.

A lo largo de los años, se han incorporado al Comité Organizador profesionales de la *Universitat Autònoma de Barcelona* y del *Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya*. También se ha incluido el Comité Científico formado por profesionales nacionales relacionados con la psicopatía. Estas colaboraciones han permitido aumentar los objetivos de la Jornada, y consolidar su valor como espacio de reflexión interdisciplinar en torno a la psicopatía.



La presente edición se ha centrado en las posibilidades del **tratamiento precoz** y en las consecuencias de no identificar y abordar, desde etapas tempranas, los **rasgos de Dureza e Insensibilidad Afectiva** (rasgos DIA) en la infancia y la adolescencia. Se trata de una temática de gran relevancia, que interpela tanto a profesionales del ámbito clínico e investigador, como a los del entorno forense y académico. Ha contado con ponentes de prestigio tanto a nivel nacional como internacional.


Como cada año, la Jornada ha estado acreditada por el *Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries* y la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud, y también ha contado con el aval de la *Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental*.

Desde el Comité Organizador queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el interés, la participación y la continuidad que, año tras año, nos brindáis. Como muestra de este reconocimiento, os hacemos entrega de este **Libro de Actas**, que recoge la información más relevante, las ponencias y las comunicaciones de la Jornada.

Esperando compartir la VIII Jornada de Psicopatía con vosotros en 2027, recibid un cordial saludo,

Comité Organizador de la VII Jornada de Psicopatía





PROGRAMA

VII JORNADA DE PSICOPATÍA

Avances en Psicopatía. De la investigación al
tratamiento



28 de febrero de 2025

Auditori del Centre de Cultures

i Cooperació Transfronterera

Universitat de Lleida

Lleida





Salut/  Gestió de
Serveis Sanitaris

 HOSPITAL
UNIVERSITARI
DE SANTA MARIA

SJD
Sant Joan de Déu
Terres de Lleida

 Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu
Província d'Espanya


Universitat de Lleida



VII JORNADA DE PSICOPATÍA


Avances en Psicopatía. De la investigación al tratamiento


28 de febrero de 2025

Auditorio del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

Campus Cappont

📍 C/ Jaume II, 67, 25110 Lleida





9:00 – 9:15h

ACTO INAUGURAL

Josep Tristany, Rosa M. Pérez, Jordi Blanch, Ester Castan, Montse Rué

9:15 – 9:30h

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

Beatriz Molinuevo, Iolanda Batalla

9:30 – 11:00h

SIMPOSIO: ACTUALIZACIONES EN PSICOPATÍA

Moderadora: Laura López-Romero

¿Cuántos psicópatas hay entre nosotros? Prevalencia de la psicopatía en la población general.

Jesús Sanz Fernández. *Catedrático de Psicología de la Personalidad, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid.*

Avances en los correlatos cognitivos y emocionales de los rasgos psicopáticos: implicaciones para el tratamiento en niños/as y jóvenes.

Anastasya Ivanova. *Profesora asociada. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona.*

11:00 – 11:45h

DESCANSO, COFFEE BREAK Y SESIÓN DE PÓSTERES

11:45 – 12:45h

COMUNICACIONES ORALES

Moderadora: Beatriz Molinuevo

13:00 – 14:30h



MASTERCLASS: Advances in understanding, assessing, and treating youth with severe conduct problems and callous-unemotional traits. (Presencial con traducción simultánea).


Moderadora: Anna Huguet

Eva R. Kimonis. *Parent-Child Research Clinic, School of Psychology, University of New South Wales, Sydney Australia.*

14:30 – 15:30h

COMIDA Y NETWORKING





15:30 – 17:00h

LA PSICOPATÍA DESDE OTROS PUNTOS DE VISTA: Psicopatía, antisocialidad y parafilias comórbidas en un perfil criminal reincidente.

Moderador: Àngel Cuquerella

Itziar Idiáquez Alberdi. *Psiquiatra. Médica forense.*

Claudina Vidal Gutiérrez. *Médica forense.*



Graciella Moreno Graupera. *Magistrada Juzgado 1ª Instancia nº58 de Barcelona. Escritora.*


Rafael Melero Rojo. *Subinspector Mossos d'Esquadra. Escritor.*

17:00h

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA

Eva Kimonis, Roser Nadal, Àngel Cuquerella





LISTADO DE PÓSTERES

P01. Propiedades psicométricas de una escala de psicopatía basada en el NEO PI-R

Ana Sanz-García, María Paz García-Vera y Jesús Sanz

P02. *Dark Factor of Personality (D)*: Evaluación de las propiedades psicométricas del cuestionario D-16 en adolescentes españoles

José María Casas, Fabia Morales Vives, Pere Joan Ferrando Piera

P03. Diferencias en respuestas cerebrales y comportamiento entre variantes primarias y secundarias de rasgos callosos-no emocionales en adolescentes

Lucia Hernandez-Pena, Emily R. Perkins, Samantha Perlstein, Samuel W. Hawes, Amy L. Byrd, Lisa Wagels, Adrian Raine, y Rebecca Waller

P04. *Dark youths in dark environments perform dark behaviors*

Álvaro Ortega Pérez, Verónica Vidal Arenas, Generós Ortet Fabregat, Laura Mezquita Guillamón y Manuel Ignacio Ibáñez Ribes

P05. *L'escala PCL-R com l'eina clau per la detecció i l'avaluació de la psicopatia*

Maria Plana Rodriguez, Lorena Farre Masip y Marina Ramos Do Rosario

P06. Psicopatía: ¿Patología o estrategia reproductiva?



Gemma Vall Boada, Fernando Gutiérrez y José Ruiz


P07. Los rasgos de psicopatía como predictores de sanciones disciplinarias graves en jóvenes que cumplen medida de internamiento en un centro educativo

Ximena Mogollón, Anastasiya Ivanova, Jose-Blas Navarro, Albert Bonillo, Rafael Torrubia y Beatriz Molinuevo

P08. *Prosocial behaviour in girls and boys in the ABCD cohort: The role of internalizing and externalizing problems and psychopathic traits*

Mariona Aparicio Muñoz, Anastasiya Ivanova-Serokhvastova, David Quevedo-Barber, Bernat Soley, Sebastian Fernández-Ortiz, Albert Bonillo, Silvia Fuentes, Eva Penelo, Montserrat Pàmies, Roser Nadal y Beatriz Molinuevo





P09. *Using artificial intelligence to predict recidivism and type of crime in a sample of psychopathic offenders without comorbid psychiatric disorders*

Emma Louise Williams, Macià Buades-Rotger, Beatriz Domínguez-Álvarez, Lidia Gual, David Kosson, Vanessa Pera-Guardiola y Iolanda Batalla

P10. *Sex differences in the relationship between psychopathic traits and stress response in childhood*

Bernat Soley, Antonio Armario, Diego Palao, Silvia Fuentes y Roser Nadal

P11. *Characterizing psychopathic traits and conduct problems in the ABCD community children cohort: a latent profile approach*

David Quevedo-Barber, Anastasiya Ivanova- Serokhvestova, Albert Bonillo, Silvia Fuentes, Sebastián Fernández-Ortiz, Bernat Soley-Mateu, Roser Nadal y Beatriz Molinuevo

P12. *Psicopatía, alexitimia y regulación emocional: claves en el diseño de estrategias de prevención comunitarias*



Andrea Cortés Ruiz y Oriol Solé Barriga


P13. *The network configuration of psychopathic traits and associated risk factors in a Spanish forensic sample*

Emma Louise Williams, Beatriz Domínguez-Álvarez, Macià Buades-Rotger y Iolanda Batalla


P14. *Trastorno de conducta con rasgos psicopáticos: a propósito de un caso*


Cristina Tablero Nadal, Irina Olasz Aguayo, Mariona Aparicio Muñoz, Maria Ruiz Ortiz, Ariadna Bonet Soto, Núria Martí Oristrell, Ana Isabel Cebrià Meca, Ariadna Solanilla Marín y Maria Triola Gaju





ORGANIZACIÓN





Comité Organizador

Presidenta: Iolanda Batalla	GSS-Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida. UdL. IRBLleida
Ángel Cuquerella	Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya
Anna Huguet	Sant Joan de Déu Terres de Lleida, UdL
Beatriz Molinuevo	Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Institut de Neurociències (UAB)
Roser Nadal	UAB, Institut de Neurociències (UAB)
Vanessa Pera	Sant Joan de Déu Terres de Lleida. UdL. IRBLleida
Rafael Torrubia	UAB, Institut de Neurociències (UAB)

Comité Científico

Macià Buades	Universitat de Barcelona
Manel Capdevila	Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Lucía Halty	Universidad Pontificia de Comillas - Madrid
Manuel Ibáñez	Universitat Jaume I - Castellón
Anastasya Ivanova	UAB, Institut de Neurociències (UAB)
Laura López-Romero	<i>Universidade de Santiago de Compostela</i>
Fàbia Morales	Universitat Rovira i Virgili
Jorge Moya	Universitat de Lleida
Roser Poy	Universitat Jaume I - Castellón



Entidades organizadoras * y coorganizadoras


Universitat de Lleida*

Servicio de Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones y Formación continuada de GSS-Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida


Formación, Docencia e Innovación de Sant Joan de Déu Terres de Lleida


Fundació Universitat de Lleida





PONENTES






¿Cuántos psicópatas hay entre nosotros? Prevalencia de la psicopatía en la población general


Jesús Sanz Fernández. *Catedrático de Psicología de la Personalidad, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid*



A raíz de la publicación de un libro sobre las relaciones de pareja con personas con personalidad psicopática, aparecieron varios artículos en la prensa española que afirmaban en sus titulares: “En España hay seis millones de psicópatas puros y personalidades psicopáticas”.

Estos artículos se hacían eco de la proyección en España de los porcentajes de personas con psicopatía clínica y subclínica en la población general encontrados en algunos estudios realizados en otros países, pero estos estudios arrojan tasas de prevalencia de la psicopatía en la población general muy dispares. En la presente conferencia se presentarán los resultados de dos estudios realizados con el objetivo general de estimar la prevalencia de la psicopatía en la población general, uno de revisión meta analítica de la literatura científica y otro empírico de estimación de la prevalencia a partir de una muestra de 682 adultos de la población general española y utilizando el modelo de los cinco grandes de los rasgos de personalidad como marco para integrar diferentes definiciones de psicopatía. Los resultados de la revisión meta analítica indican que la prevalencia de la psicopatía en la población general adulta se puede estimar en un 4,5% a partir de los estudios realizados en EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, Suecia, Portugal y Bélgica, pero utilizando los instrumentos más validados podría situarse en tan solo 1,2%. Este último porcentaje es similar al encontrado en España en el segundo estudio, en el cual se halló que la prevalencia en la población general española de la psicopatía clínica es 0,55% y la de la psicopatía subclínica es 1,65%. Estos resultados cuestionan las afirmaciones alarmistas de algunas publicaciones y medios de comunicación que alertan sobre la existencia en la sociedad de un número muy elevado de personas con psicopatía que pueden causar muchos daños sociales, económicos, físicos y psicológicos en los demás. Finalmente, se discuten las limitaciones que presenta la literatura científica sobre la prevalencia de la psicopatía en la población general y los problemas teóricos y metodológicos que implica la estimación de dicha prevalencia.







Avances en los correlatos cognitivos y emocionales de los rasgos psicopáticos: implicaciones para el tratamiento en niños/as y jóvenes


Anastasyia Ivanova-Serokhvastova. *Profesora asociada. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona.*



La psicopatía se considera cada vez más un trastorno del neurodesarrollo, ya que parece tener raíces en la infancia o la adolescencia. La evidencia actual muestra que los correlatos cognitivos y emocionales específicos pueden distinguir a las niñas y niños con problemas de conducta y rasgos psicopáticos que están en riesgo de mostrar comportamiento antisocial en la adolescencia y psicopatía en la adultez. Uno de estos déficits son las alteraciones en el condicionamiento del miedo, donde se observan respuestas fisiológicas reducidas a señales de amenaza, a pesar de preservar la capacidad cognitiva para reconocer estas amenazas. Otro posible déficit son las dificultades a la hora de reconocer las emociones de otras personas, vinculadas a la falta de atención al área de ojos de los demás.

Esta línea de investigación conduce a una mejor comprensión de las dificultades para socializar en estas niñas y niños y ayuda a diseñar e implementar intervenciones tempranas que aborden los déficits neurocognitivos y emocionales específicos mientras los comportamientos aún son maleables.








Advances in understanding, assessing, and treating youth with severe conduct problems and callous-unemotional traits

Eva R. Kimonis, Parent-Child Research Clinic, School of Psychology, University of New South Wales, Sydney Australia.






Children presenting with symptoms of conduct disorders are a heterogeneous population and it is widely accepted that these disorders develop through multiple pathways. In particular, the presence of callous-unemotional (CU) traits has proven clinically useful for identifying those children and adolescents with earlier starting, more aggressive, and persistent conduct problem symptoms, which are underpinned by distinct mechanisms from youth without CU traits, and less responsive to traditional treatments. Longitudinal studies find that CU traits predict the later development of antisocial personality disorder, and these traits are thought to be a developmental antecedent to adult psychopathy. Decades of research are devoted to understanding how CU traits develop, but knowledge is limited on how to optimally treat this high-risk population. Professor Kimonis will discuss recent advances in assessing and treating children with conduct disorders within clinic and school settings from her translational program of clinical research.





MESAS, SIMPOSIOS Y MASTERCLASS





Actualizaciones en psicopatía

Moderadora: Laura López-Romero

¿Cuántos psicópatas hay entre nosotros? Prevalencia de la psicopatía en la población general.

Jesús Sanz Fernández. Catedrático de Psicología de la Personalidad, Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid.

Avances en los correlatos cognitivos y emocionales de los rasgos psicopáticos: implicaciones para el tratamiento en niños/as y jóvenes.

Anastasya Ivanova. Profesora asociada. Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona.

Mesa de comunicaciones orales

Moderadora: Beatriz Molinuevo

Diferencias en respuestas cerebrales y comportamiento entre variantes primarias y secundarias de rasgos callosos-no emocionales en adolescentes

Lucia Hernández-Pena

Dark youths in dark environments perform dark behaviors

Álvaro Ortega Pérez

Characterizing psychopathic traits and conduct problems in the ABCD community children cohort: a latent profile approach

David Quevedo-Barber



Propiedades psicométricas de una escala de psicopatía basada en el NEO PI-R


Anna Sanz-García

MASTERCLASS: Advances in understanding, assessing, and treating youth with severe conduct problems and callous-unemotional traits

Moderadora: Anna Huguet

Eva R. Kimonis. *Parent-Child Research Clinic, School of Psychology, University of New South Wales, Sydney Australia*





LA PSICOPATÍA DESDE OTROS PUNTOS DE VISTA. Psicopatía, Antisocialidad y parafilias comórbidas en un perfil criminal reincidente



Moderador: Àngel Cuquerella


Itziar Idiáquez Alberdi. *Psiquiatra. Médica forense.*

Claudina Vidal Gutiérrez. *Médica forense.*



Graciella Moreno Graupera. *Magistrada Juzgado 1ª Instancia nº 58 de Barcelona. Escritora.*


Rafael Melero Rojo. *Subinspector Mossos d'Esquadra. Escritor.*





MESAS REDONDAS







LA PSICOPATÍA DESDE OTROS PUNTOS DE VISTA. Psicopatía, Antisocialidad y parafilias comórbidas en un perfil criminal reincidente


Composición Mesa: Ponentes: Sr. Rafael Melero Rojo (Subinspector MMEE y escritor), Dra. Claudina Vidal Gutiérrez (Médica forense), Dra. Itziar Idiáquez Alberdi (psiquiatra y médica forense), Ilma. Sra. Graciella Moreno Graupera (magistrada Juzgado Primera instancia núm. 58 de Barcelona y escritora); Moderador: Dr. Àngel Cuquerella Fuentes (médico forense, psicólogo forense).

Introducción: La mesa redonda orbitó sobre el caso del penado Sr. P.J.G., condenado a 93 años y 11 meses de prisión por dos delitos de asesinato (dos policías nacionales en prácticas), violación, allanamiento de morada, profanación de cadáver, incendio, robo con violencia y quebrantamiento de condena, cometidos todos ellos el 5 de octubre de 2004.


Resumen: De acuerdo a la actuación de los diferentes profesionales del caso, el subinspector MMEE Sr. Melero describió la crudeza de la investigación policial, en el levantamiento del cadáver y el estudio criminalístico en la escena de los hechos, aportando el impacto de la vivencia profesional y personal, en dicho levantamiento. La médica forense Dra. Vidal describió el levantamiento de los cadáveres, con lesiones de control, ensañamiento y sadismo sexual, aportando datos Periciais *pre*, *peri* y *post mortem* de los cadáveres, con fotografías de la autopsia forense. A continuación, la Dra. Idiáquez hizo un perfil psiquiátrico forense del penado, destacando el historial personal y familiar que pudo haber influido en la etiopatogenia del trastorno, su precoz contacto con Cuerpos de seguridad y el ámbito judicial de Menores, el perfil serial de sus delitos sexuales, violentos y parafílicos, así como sus rasgos psicopáticos y antisociales. Finalmente, la Ilma. Magistrada Sra. Moreno aportó el análisis jurídico y jurisprudencial de las sentencias relativas al penado, recordando la nulidad de un primer juicio de Jurado.


Conclusiones: Se evidenció la importancia del análisis criminológico y multidisciplinario de la escena criminal, así como de la evaluación psicopática del penado y de sus comorbilidades asociadas, especialmente del sadismo/homicidio sexual, y de la siempre necesaria actualización de todos los profesionales implicados en estos casos, de elevada complejidad, así como de la intervención en red y conjunta, en las investigaciones policiales-judiciales. También, y de acuerdo con la temática de la Jornada, se evidenció la importancia de la detección e intervención precoz en los niños con rasgos de dureza e insensibilidad afectiva, para evitar el desarrollo de la psicopatía en la edad adulta.





PÓSTERS








P01. Propiedades psicométricas de una escala de psicopatía basada en el NEO PI-R

Ana Sanz-García, María Paz García-Vera y Jesús Sanz
Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica.
Universidad Complutense de Madrid

Abstract

Una creciente literatura científica concibe la psicopatía como una variante desadaptativa de la personalidad normal, reflejando el interés más general por entender los trastornos de la personalidad desde el modelo de los cinco factores (MCF) o Big Five. Sanz-García et al. (2022) desarrollaron una escala de psicopatía (EP-NEO) basada en el Inventario de Personalidad NEO Revisado (NEO PI-R) de Costa y McCrae (1992), el instrumento estándar para la evaluación del MCF. El objetivo de este póster es resumir los resultados de varios estudios realizados para examinar la fiabilidad y validez de la EP-NEO en muestras de adultos voluntarios de la población general española (N = 682, 239 y 159). La EP-NEO presentó una estructura de tres factores correlacionados (Interpersonal, Afectivo y Estilo de vida) semejantes a los del modelo de Hare de psicopatía que subyace tras la PCL-R. Los coeficientes de consistencia interna fueron excelentes para la puntuación total (alfa = 0,88-0,89) y entre buenos y excelentes para las puntuaciones de sus escalas (alfa = 0,82-0,86). Las correlaciones convergentes con medidas del trastorno antisocial de la personalidad del NEO PI-R fueron excelentes ($r = 0,88-0,96$) y mayores que las correlaciones discriminantes con medidas de otros trastornos de la personalidad del NEO PI-R, y las correlaciones convergentes con la medida de psicopatía del SRP-4 fueron buenas ($r = 0,62-0,68$). Estos resultados sugieren que la EP-NEO proporciona medidas fiables y válidas de la psicopatía en adultos españoles evaluados en situaciones en las que no hay interés directo en distorsionar las respuestas.








P02. *Dark Factor of Personality (D)*: Evaluación de las propiedades psicométricas del cuestionario D-16 en adolescentes españoles

Jose Maria Casas, Fabia Morales Vives, Pere Joan Ferrando Piera
Facultad de Ciencias de la Educacion y Psicologia.
Universitat Rovira i Virgili

Abstract

En 2018, Moshagen y colaboradores plantearon la existencia de un factor común de personalidad que integraría distintos aspectos “oscuros” o “aversivos” de la personalidad, al que denominaron *Dark Factor of Personality (D)*. Esta teoría ha dado lugar al desarrollo de una escala principal (D-70) y dos versiones abreviadas (D-35, y D-16) que se han adaptado recientemente en diferentes idiomas y culturas, aunque en España solo se ha adaptado el D-70. Por ese motivo, el presente estudio se centra en la evaluación de las propiedades psicométricas del D-16 en adolescentes españoles. La muestra consiste en 739 adolescentes de 14 a 19 años (44,2% chicas). Además del D-16 se administró el cuestionario "Inventory of Callous-unemotional traits and Antisocial behaviour" (INCA), que evalúa conducta antisocial y precursores de la psicopatía, el cuestionario de agresividad I-DAQ, y el cuestionario de impulsividad BIS-11c. Se dividió la muestra en dos mitades equivalentes utilizando el método Solomon, y se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio en la primera mitad y un análisis factorial confirmatorio en la segunda, obteniendo resultados equivalentes, con una clara estructura unidimensional, adecuada fiabilidad y adecuados índices de bondad de ajuste. Respecto al modelo de ecuaciones estructurales evaluado, los resultados muestran el papel relevante del factor D y de la impulsividad en la predicción de la conducta agresiva y la conducta antisocial. Por lo tanto, el D-16 tiene adecuadas propiedades psicométricas y puede ser útil para evaluar de forma rápida y sencilla las características vinculadas a la personalidad oscura en adolescentes.





P03. Diferencias en respuestas cerebrales y comportamiento entre variantes primarias y secundarias de rasgos callosos-no emocionales en adolescentes

Lucia Hernandez-Pena, Emily R. Perkins, Samantha Perlstein, Samuel W. Hawes,
Amy L. Byrd, Lisa Wagels, Adrian Raine, y Rebecca Waller

Department of Psychology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA



Department of Psychiatry, Psychosomatics and Psychotherapy, Medical Faculty, RWTH
Aachen University, Aachen, Germany


Abstract

Los rasgos callosos-no emocionales (CU), caracterizados por la falta de empatía y culpa, aumentan el riesgo de conducta antisocial. Los niños con rasgos CU se dividen en variantes primarias (bajo arousal emocional e insensibilidad al castigo) y secundarias (alto arousal emocional y trauma). Pocos estudios han explorado las respuestas cerebrales a procesamiento de recompensa y pérdida entre estas variantes, lo que podría aclarar los mecanismos de riesgo subyacentes.

En este estudio prerregistrado (<https://osf.io/ntpz4>), utilizamos datos de cuatro fases anuales del estudio Adolescent Brain and Cognitive Development, con participantes entre 9-10 años al inicio. Clasificamos a los participantes según puntos de corte clínicos: variante primaria ($n=132$; rasgos CU altos, baja ansiedad), variante secundaria ($n=74$; rasgos CU altos, alta ansiedad), un grupo solo con alta ansiedad ($n=171$) y un grupo control con desarrollo típico ($n=3544$; rasgos CU bajos y baja ansiedad). Se emparejaron los grupos basándose en datos demográficos (todos $n=73$).

Los resultados indican que las variantes primaria y secundaria muestran mayor agresividad, impulsividad y delincuencia en comparación con los otros grupos, siendo la variante secundaria la que presenta una mayor exposición a traumas. Además, este grupo también mostró una activación significativamente mayor en regiones prefrontales y subcorticales (incluyendo cuerpo estriado y amígdala) durante la anticipación de recompensas. En contraste, la variante primaria presentó una menor activación en regiones frontales ante el feedback de pérdida. Estos hallazgos destacan la necesidad de tratamientos personalizados para las variantes primarias y secundarias de rasgos CU, considerando sus diferentes respuestas ante recompensas y pérdidas.





P04. Dark youths in dark environments perform dark behaviors



Álvaro Ortega Pérez, Verónica Vidal Arenas, Generós Ortet Fabregat, Laura Mezquita Guillamón y Manuel Ignacio Ibáñez Ribes
Universitat Jaume I (UJI)


Abstract

Adolescence is a key stage for certain harmful behaviors, such as bullying and cyberbullying, or antisocial and aggressive behaviors. Multiple individual and social factors contribute to its development, such as personality, exposure to violent environments, or the influence of the peer group. Research has tended to address these factors individually and in isolation, so the aim of this work is to integrate and investigate how dark personality moderates the impact of these social aspects in the manifestation of harmful behaviors during adolescence.

659 ESO students completed a battery that assessed trait psychopathy, exposure to violence, anti-normative behaviors of friends, and antisocial, aggressive, bullying and cyber-bullying behaviors. The main results showed direct effects of the predictor variables on all four behaviors. In addition, we found significant interaction effects: psychopathic traits interacted with the degree of exposure to violence in the performance of cyberbullying ($\beta = .111$), aggressive ($\beta = .113$) and anti-normative behaviors ($\beta = .079$), and with the group of anti-normative friends in aggressive behaviors ($\beta = .093$).

These data show how the influence of anti-normative friends and exposure to violent environments was more detrimental in those adolescents high in psychopathy than for youth low in this trait. In conclusion, this study demonstrates how the simultaneous assessment of several psychological and social variables can improve the understanding of the development of dark behaviors in adolescence.





P05. L'escala PCL-R com l'eina clau per la detecció i l'avaluació de la psicopatia

Maria Plana Rodriguez, Lorena Farre Masip y Marina Ramos Do Rosario
Hospital Universitari Santa Maria

Abstract



L'escala Psychopathy CheckList Revised, o més coneguda com PCL-R, és una escala dissenyada pel psicòleg canadenc Robert Hare que consta de 20 ítems desglossats en 4 fases: interpersonal, afectiva, estil de vida i antisocial. Els resultats dels ítems de l'escala PCL-R s'apliquen de la següent forma: 0 si no és aplicable, 1 si és aplicable en algunes ocasions i 2 si és aplicable a l'estil de vida i comportament del pacient. Actualment, és l'escala més utilitzada dins la psiquiatria forense i penitenciària per la detecció de psicòpates dins aquests ambients.


Avaluar la prevalença de l'ús de l'eina PCL-R per la detecció i l'avaluació de la psicopatia.

Es realitza una cerca en les diferents bases de dades per com PubMed, Scopus i SciELO, a més a més de buscadors en línia com Google Scholar i es limiten els resultats a través de: paraules claus com psicopatia, psychopathy, PCL-R, Robert Hare, prevalencia, prevalence; idiomes anglès, castellà i català; i interval d'anys de 2019-2025.

De tots els estudis que s'han escollit, la majoria coincideixen que dins l'àmbit de privació de llibertat, l'eina PCL-R és la més utilitzada per a la detecció de psicòpates dins els centres penitenciaris.

Tot i que en l'actualitat existeixen més eines, la PCL-R continua sent la més completa i indicada en l'àmbit de la psiquiatria forense i penitenciària. Gràcies a aquesta eina, s'ha pogut esbrinar que al 2021 la prevalença de la psicopatia en la població adulta general era del 1,2%.








P06. Psicopatía: ¿Patología o estrategia reproductiva?

Gemma Vall Boada, Fernando Gutiérrez y José Ruiz
GSS-Hospital Universitari de Santa María

Abstract

Desde la perspectiva evolucionista de los trastornos de la personalidad, la psicopatía no se entiende como una patología sino como una estrategia vital alternativa que favorece la eficacia biológica (éxito reproductivo), aunque con costes asociados para las relaciones interpersonales. No obstante, los datos de los que disponemos para apoyar esta posibilidad son incipientes (Vall et al. 2015). Por este motivo, queremos examinar si los rasgos de impulsividad y antagonismo mantienen relaciones significativas con variables de fertilidad y apareamiento, mediante regresión lineal múltiple y binomial negativa, en una muestra de 2116 participantes de población comunitaria y pacientes ambulatorios de una unidad de Trastorno de la Personalidad, valorados con el inventario de personalidad para el DSM-V (Krueger, 2013). Ninguno de los dos rasgos incrementa significativamente el número de hijos. Sin embargo, la desinhibición aumenta el número de parejas en ambos sexos ($\beta = 0.288$, $p < 0.001$) y adelanta la paternidad en hombres ($\beta = -2.07$, $p < 0.01$), lo que constituye una estrategia reproductiva rápida. Estos resultados apoyan la idea que los rasgos psicopáticos se mantienen en la población mediante mecanismos de selección sexual, y mejoran la comprensión de sus causas y su naturaleza.








P07. Los rasgos de psicopatía como predictores de sanciones disciplinarias graves en jóvenes que cumplen medida de internamiento en un centro educativo

Ximena Mogollón, Anastasiya Ivanova, Jose-Blas Navarro, Albert Bonillo, Rafael
Torrubia y Beatriz Molinuevo
Universidad Autónoma de Barcelona

Abstract

Los rasgos psicopáticos, definidos como un constructo multidimensional que incluye características interpersonales, afectivas y conductuales, se han asociado con el desarrollo temprano de comportamientos desadaptativos. Estos rasgos representan un factor de riesgo significativo vinculado a una mayor peligrosidad y a la aparición de conductas disruptivas en contextos institucionales. Sin embargo, la metodología utilizada en la evaluación de la psicopatía y la fuente de información pueden condicionar los resultados obtenidos. El objetivo de este estudio fue analizar si los rasgos psicopáticos predicen la ocurrencia de sanciones disciplinarias en 72 adolescentes y jóvenes de alto riesgo, con edades entre 14 y 22 años, que cumplieran medida de internamiento en un centro educativo de justicia juvenil. La evaluación de los rasgos psicopáticos se realizó a través de una perspectiva multi-método y multi-informante. Los resultados indican que los rasgos psicopáticos se asocian significativamente con la cantidad de sanciones graves y muy graves registradas durante la medida. En particular, puntuaciones más altas en las dimensiones Afectiva y Estilo de Vida se asociaron con mayor número de sanciones. Contrariamente, puntuaciones altas en la dimensión Interpersonal se asociaron con un menor número de sanciones. Las relaciones encontradas varían en función del instrumento utilizado (mayor asociación con las entrevistas clínicas). Estos hallazgos subrayan la importancia de incluir la evaluación de los rasgos psicopáticos en el ámbito de la justicia juvenil desde una perspectiva multi-método.





P08. Prosocial behaviour in girls and boys in the ABCD cohort: The role of internalizing and externalizing problems and psychopathic traits

Mariona Aparicio Muñoz, Anastasiya Ivanova-Serokhvastova, David Quevedo-Barber, Bernat Soley, Sebastian Fernández-Ortiz, Albert Bonillo, Silvia Fuentes, Eva Penelo, Montserrat Pàmies, Roser Nadal y Beatriz Molinuevo

Department of Psychiatry and Forensic Medicine, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)



Institut de Neurociències, UAB


Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

CIBERSAM

Abstract

Prosocial behaviour is key for the healthy development of children and adolescents. Recent studies suggest a negative relationship between psychopathology and prosocial behaviour in children, and psychopathic traits are also associated with lower prosocial behaviour. However, more research is needed to understand the relationship between these variables. The objective is to study the relationship between internalising and externalizing problems, psychopathic traits and prosociality in the ABCD cohort of first-grade girls and boys from a multi-informant perspective. The sample includes 842 children (49.3% girls) in first grade (W1) and in second grade (W2, n = 625, 74% retention, 47% girls) from 52 schools in Sabadell. A primary caregiver and teachers answered the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and the caregiver informed on the Child Problematic Traits Inventory (CPTI). Four multiple regression analyses (stepwise method) were conducted. Results showed that Callous-Unemotional (CU) traits emerged as the first predictor of lower prosocial behaviour, followed by sex (boys), and Externalizing problems (W1 and W2) according to caregivers. Contrarily, Impulsive-Need for Stimulation traits predicted higher prosocial behaviour (W1). When teachers informed about prosocial behaviour, Externalizing problems and sex (W1 and W2) were a stronger predictor than CU traits. These data underscore the importance of assessing and addressing externalizing problems and psychopathic traits, particularly CU traits, to encourage prosociality in children. Considering a sex perspective is crucial in understanding these characteristics. The findings suggest the need for community preventive programs and early detection strategies to enhance children's well-being and promote healthy socio-emotional development.





P09. Using artificial intelligence to predict recidivism and type of crime in a sample of psychopathic offenders without comorbid psychiatric disorders



Emma Louise Williams, Macià Buades-Rotger, Beatriz Domínguez-Álvarez, Lidia Gual, David Kosson, Vanessa Pera-Guardiola y Iolanda Batalla
Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, Facultat de Psicologia.
Universitat de Barcelona


Abstract

Psychopathic offenders may experience other comorbid psychiatric disorders, which makes it difficult to ascertain which features are specific to psychopathy and which ones might be transdiagnostic. This, in turn, complicates risk assessment and model generalizability, since a factor associated with violence in one sample might rather be linked with internalizing symptomatology in another. Moreover, linear models (GLMs; the most commonly employed model family) may perform suboptimally in small samples as well as in the presence of multicollinearity. Artificial intelligence (AI) models often outperform GLMs in the limited sample sizes typical of forensic psychiatry. Furthermore, AI models are better suited to handle non-linear relationships without relying on GLMs' often strict assumptions.

In this study, we will leverage a unique sample of male psychopathic offenders that did not fulfill criteria for a comorbid psychiatric disorder ($n=104$, mean age= 36 ± 8) to compare a series of AI and parametric models (random forest, support vector machine, neural network, and logistic regression) against each other in predicting recidivism from a host of psychosocial (e.g., childhood maltreatment, neglect), neurocognitive (e.g., impulsivity, executive function), and personality variables (e.g., psychopathic traits).

Preliminary analyses revealed that random forests outperformed all other models (75% accuracy), though a neural network achieved the best tradeoff between sensitivity (63%) and specificity (69%). Impulsivity, platelet monoamine oxidase-a (MAOA) activity, and cognitive ability were among the top predictors of recidivism. Our results will provide actionable insights toward the application of artificial intelligence to risk assessment in forensic settings.





P10. Sex differences in the relationship between psychopathic traits and stress response in childhood

Bernat Soley, Antonio Armario, Diego Palao, Silvia Fuentes y Roser Nadal
Universitat Autònoma de Barcelona



Abstract


Stress responses mediate reactions to harmful or fearful situations, and individuals with high psychopathic traits are often described as fearless and insensitive to punishment. The sympathetic nervous system, central to stress responses such as fight-or-flight, can be assessed non-invasively via salivary alpha-amylase (sAA). While prior studies report a negative relationship between psychopathic traits and sAA, research focusing on children and sex differences remains limited and controversial. It is also unclear what the relationships are between stress biomarkers and the different dimensions that constitute psychopathy: interpersonal, behavioral and emotional.

Participants (181 children, 7–8 years old, 53% female) were recruited from the Sabadell ABCD cohort. Psychopathic traits were assessed by parents using the Child Problematic Traits Inventory (CPTI), including Grandiose-Deceitful (GD), Impulsive- Need for Stimulation (INS), and Callous-Unemotional (CU) dimensions during 2022- 2023 academic year. A few months later, children underwent an acute psychosocial stressor, the Trier Social Stress Test (TSST-M), providing five saliva samples, and reported self-perceived stress using the Self-Assessment Manikin (SAM).

In girls, sAA levels were negatively correlated with GD and INS dimensions and marginally with the CPTI global score, but not with CU. In boys, sAA was positively correlated with INS only. Self-perceived stress showed a marginal correlation with GD in boys.

These findings highlight a sexually dimorphic relationship between psychopathic traits and non-adaptive stress responses, especially regarding interpersonal and behavioral dimensions. The results emphasize the importance of incorporating a gender perspective in future research and confirm a dissociation between physiological and subjective stress responses.





P11. Characterizing psychopathic traits and conduct problems in the ABCD community children cohort: a latent profile approach

David Quevedo-Barber, Anastasiya Ivanova- Serokhvastova, Albert Bonillo, Silvia Fuentes, Sebastián Fernández-Ortiz, Bernat Soley-Mateu, Roser Nadal y Beatriz Molinuevo

Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut, Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de psiquiatria i de Medicina legal, UAB

Institut de Neurociències, UAB



CIBERSAM


Abstract

Psychopathic personality encompasses interpersonal, affective and behavioral traits. Although profiling research have further expanded the knowledge of psychopathy, most studies have focused on adult male offenders. The scarce literature regarding child population mostly describes a four-class model solution explaining primary and secondary variants of psychopathy, using Callous-Unemotional (CU) and anxiety traits. Also, as the presence of Conduct Problems (CP) and CU describes a more severe and chronic conduct pattern, other recent studies have focused on its relation describing a four-class model solution. However, the role of the other psychopathic domains along with CP in children is still underexplored.

The present study aims to characterize different profiles of psychopathic traits alongside CP in a children community sample. The sample is composed of 814 children (49 % girls) (M age = 6.82; SD = 0.31) from the ABCD cohort (Sabadell, Catalonia). The subtype profiles were created using a Latent Profile Analysis based on the parents' responses of the Child Psychopathic Traits Inventory and the Conduct Problem scale from the Strengths and Difficulties Questionnaire.

A five-class solution was best, consistent with the scarce evidence, and the following classes emerged: general, impulsive, grandiose-disruptive, callous and psychopathic traits propensity. These findings help to understand heterogeneity in children with externalizing problems and to develop specific treatment targets based on differentiated profiles.








P12. Psicopatía, alexitimia y regulación emocional: claves en el diseño de estrategias de prevención comunitarias

Andrea Cortés Ruiz y Oriol Solé Barriga
CAP Primer de Maig – Institut Català de la Salut

Abstract

Las disfunciones emocionales han sido vinculadas a la psicopatía. No obstante, la relación con problemas en la regulación emocional ha sido esclarecida recientemente. Este estudio revisa literatura científica con el objetivo de identificar áreas clave para diseñar estrategias preventivas comunitarias enfocadas en las disfunciones emocionales asociadas a la psicopatía y la alexitimia. Se analizaron 30 artículos relevantes de los últimos 5 años extraídos de las bases de datos PubMed y Scopus. Los resultados evidencian una fuerte conexión entre los rasgos psicopáticos y las dificultades en la regulación emocional, como el reconocimiento, la aceptación y la expresión de las emociones. En particular, las personas con rasgos psicopáticos presentan una comprensión limitada de sus emociones, lo que dificulta la gestión de impulsividad y otras conductas asociadas. Los estudios destacan la importancia de incluir módulos sobre regulación emocional en intervenciones comunitarias, priorizando la conciencia emocional y las experiencias metaemocionales. Asimismo, las estrategias de regulación emocional emergen como predictores sólidos de la insensibilidad emocional y los rasgos alexitímicos, lo que sugiere que centrarse en mejorar estas estrategias podría prevenir problemas asociados a la psicopatía. En conclusión, los hallazgos respaldan la creación de estrategias preventivas basadas en regulación emocional como herramienta clave para abordar disfunciones emocionales vinculadas a rasgos psicopáticos. Este enfoque puede mejorar significativamente la salud emocional en contextos comunitarios.





P13. *The network configuration of psychopathic traits and associated risk factors in a Spanish forensic sample*

Emma Louise Williams, Beatriz Domínguez-Álvarez, Macià Buades-Rotger y
Iolanda Batalla



Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia, Facultat de Psicologia.
Universitat de Barcelona


Abstract

The network analysis approach has been widely applied to the study of psychopathy (Tsang et al., 2019; Verschuere et al., 2018). However, most research has focused on unraveling the structure of psychopathic traits, rather than examining the stability of the network constellations. This is critical, as one of the main criticisms of this approach relates to the limited replicability of findings (Forbes et al., 2017). A crucial issue is to examine which factors may affect network stability. For example, if specific risk factors (e.g., early adversity, family risk, broader personality traits) have a differential impact on symptom network structure, this could be useful both to test the stability of networks and better define the nomological network of psychopathic traits from a network perspective.

In this study, we aim to investigate the associations between psychopathy and associated risk factors using a network approach. We will analyze the configuration of psychopathic traits among Spanish male offenders ($n = 104$, mean age = 36 ± 8), using data from the Psychopathy Checklist—Revised (PCL-R; Hare, 1992).

We will estimate network models and compute centrality measures, consecutively introducing risk factors in each new model to compare their influence on network configurations. We will focus particularly on the effects of risk factors on the affective features of psychopathy, a highly central facet within the network analysis literature. Identifying differences in networks associated with specific risk factors may provide new avenues for personalized interventions and future research.





P14. Trastorno de conducta con rasgos psicopáticos: a propósito de un caso

Cristina Tablero Nadal, Irina Olasz Aguayo, Mariona Aparicio Muñoz, Maria Ruiz Ortiz, Ariadna Bonet Soto, Núria Martí Oristrell, Ana Isabel Cebrià Meca, Ariadna Solanilla Marín y Maria Triola Gaju
Parc Taulí Hospital Universitari

Abstract



La psicopatía es un trastorno de personalidad que se caracteriza por falta de empatía, remordimiento y afecto superficial, así como conductas antisociales planificadas o impulsivas (Patrick, 2018). Estas personas presentan insensibilidad emocional, arrogancia, deshonestidad y manipulación, con comportamientos antisociales desde edades tempranas (De Brito et al., 2021).

El objetivo es mostrar cómo se manifiestan los rasgos psicopáticos de manera evolutiva, así como proporcionar evidencia que permita delimitar la comprensión teórica de la psicopatía y su diagnóstico diferencial.

Se realiza un análisis clínico descriptivo de un paciente de 24 años que realiza seguimiento en consultas externas del Hospital Parc Taulí. Se han recopilado los datos mediante el análisis de la historia clínica del paciente.

El caso presentado ejemplifica un cuadro clínico complejo y característico de un trastorno de conducta con rasgos psicopáticos. El paciente exhibe conductas antisociales desde la infancia, incluyendo falta de remordimiento, frialdad afectiva y empatía limitada. Estos rasgos reflejan la dimensión emocional e interpersonal de la psicopatía, evidenciada por afectividad superficial e hiporreactiva. En el ámbito conductual, destacan patrones persistentes de incumplimiento de normas, desafíos a la autoridad y desinterés por el rendimiento personal.


El caso enfatiza cómo los rasgos psicopáticos pueden identificarse desde la infancia y se acentúan con la edad, dificultando el diagnóstico diferencial con otros trastornos psicopatológicos. El policonsumo en la adultez agrega complejidad al diagnóstico, lo que resalta la necesidad de evaluaciones exhaustivas y diferenciadas a lo largo del desarrollo del individuo.





VII JORNADA DE PSICOPATÍA

Salut/SS
Gestió de
Serveis Sanitaris



HOSPITAL
UNIVERSITARI
DE SANTA MARIA

SJD
Sant Joan de Déu
Terres de Lleida



Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu
Província d'Espagna



Universitat de Lleida

